

ວັກຊີນ ໄຂ້ເລືອດດຳ

ນິຍາມ:

ວັກຊີນຊະນິດນີ້ ປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊື້ອ BACILLU SANTH — RACI ທີ່ເຂົ້າປັ ປະສົມໃສ່ກັບປະລິມານ 50% ກລີ ເຊື້ອນ ນ້ຳເກືອເປັນວັກຊີນເຊື້ອເປັນຊະນິດນ້ຳ.



ລັກສະນະອາການ

ເປັນພະຍາດທີ່ມັກເກີດກັບງົວ ຄວາຍ, ແກະ ແບ້, ໝູ ແລະ ສັດອື່ນໆ. ມັກຕາຍກະທັນຫັນ, ໄຂ້ຂັ້ນສູງພິເສດ, ຫາຍໃຈຫອບ, ຕາແດງ, ຍິນຊຸ່ນຍິນໄປມາຈົນລົ້ມຕາຍ. ໃນປະເພດທີ່ແກ່ຍາວແດ່ນັ້ນ ຈະລັງເກດເຫັນອາການໃຄ່ຕາມລຳຄໍ ຕາມໜ້າເອິກ ຄຳເບິ່ງຮູ້ສຶກຮ້ອນ, ອາຈົມມີສີດຳແກມເລືອດ ຍຽວແກມເລືອດ ເວລາສັດຕາຍຈະມີເລືອດອອກມາຕາມຮູດັງ, ປາກ, ຂົນ, ຮູທະວານ.

ຂໍ້ແນະນຳ

- ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດດຳ ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້, ໝູ
- ຫ້າມສັກສັກຖືພາ ແລະ ສັດທີ່ອ່ອນເພຍ
- ເວລາໃຊ້ຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຢາເຮັດຊະຊາຍ ຫຼື ຖືກບາດແຜຂອງຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວຕ້ອງດື່ມເຂັ້ມ. ແລະ ກ້ອງສິດຢາໃຫ້ຟືດ 1 ຊົ່ວໂມງ.

ວິທີໃຊ້

- ງົວ, ຄວາຍອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ສັກ 1 ມລ. ສັກຫຼືບໜຶ່ງ
- ແກະ, ແບ້, ໝູ ອາຍຸ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ສັກ 1 ມລ. ສັກຫຼືບໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກສັກຢາຈະມີອາການໃຄ່ເລັກນ້ອຍ ຕາມບໍລິເວນບ່ອນສັກຢາ ແລະ ອຸນນະພູມກໍ່ຈະຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ພາຍໃນໄລຍະ 2 — 3 ມື້.



ຮູບ: ການສັກຫຼືບໜຶ່ງ

ໄລຍະຄຸ້ມກັນ

ສັດຈະມີຄວາມຄຸ້ມກັນ ຫຼັງຈາກສັກຢາໄດ້ 2 ອາທິດ ແລະ ຈະຄຸ້ມກັນຕໍ່ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດຳໄດ້ 1 ປີ.

ການເກັບຮັກສາ

ຮັກສາໃນອຸນນະພູມ 4 ອົງສາ ກຸ້ມໄດ້ 1 ປີ. ເວລາຂົນຍ້າຍວັກຊີນຄວນຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມເຢັນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ.

ແກ້ວບັນຈຸ

ແກ້ວໜຶ່ງບັນຈຸ 10 ມລ / 10 ເຂັ້ມ.

ຕາຕະລາງ : ການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນ ໄຂ້ເລືອດດຳ

ຊະນິດຢາວັກຊີນ	ອາຍຸສັດຕ້ອງໃຊ້	ວິທີໃຊ້	ໄລຍະຄຸ້ມກັນ
◆ ຢາວັກຊີນ ໄຂ້ເລືອດດຳ	◆ ໃຊ້ກັບງົວ, ຄວາຍ (ອາຍຸ 6 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ). ◆ ແກະ, ແບ້ ໝູ (ອາຍຸ 3 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ)	◆ ງົວ, ຄວາຍ ສັກ 1 ມລ. (ສັກຫຼືບໜຶ່ງ) ◆ ແກະ, ແບ້ ສັກ 1 ມລ. (ສັກ ຫຼືບໜຶ່ງ)	1 ປີ



ການນຳໃຊ້ຢາ ວັກຊີນໄຂ້ເລືອດດຳ



ຄັດຈາກ: ປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ວັກຊີນສຳລັບສັດ (1997)

ຮຽບຮຽງໂດຍ :

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ (CETDU)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)

