



# ພະຍາດປາກເປື້ອຍ ລົງເລັບ

(Foot and Mouth Disease)



## ການປ້ອງກັນ

1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຂ້າສັດໃນເຂດທີ່ມີພະຍາດປາກເປື້ອຍລົງເລັບລະບາດແລ້ວຢ່າງເດັດຂາດ.
2. ແຍກສັດເຈັບອອກຈາກຝູງ
3. ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນທຸກໆ 6 ເດືອນ.



ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ສິມໄຊ ສີຊານິນ  
ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ  
ສະຫະກອນ

ຂັ້ນທະນູ 020 5599 6544

ອີເມວ :khantn\_lsv@hotmail.com

ເບີໂທ: + 85621732072

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

EU

The TAP-AIS project

Mostly by 108kaset.com



ພະຍາດປາກເປື້ອຍລົງເລັບເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ໄວທີ່ສຸດ  
ສໍາລັບສັດເລັບຕີນຄູ່ ເຊັ່ນ: ງົວ-ຄວາຍ, ແບ້ ແລະ ໝູ  
ພະຍາດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບສັດຊຸດໂຊມ,  
ນໍ້າໜັກຫຼຸດ, ຈ່ອຍຜອມ

### ອາການ:

ສັດເປັນພະຍາດນີ້ຈະບໍ່ກິນອາຫານຍ້ອນເຈັບ ປາກ  
ແລະ ເປັນຕຸ່ມ ຫຼື ບາດແຜໃນປາກ; ລິ້ນ, ເຫືອກ,  
ຜິ້ງແກ້ມ ມີນໍ້າລາຍໄຫຼເປັນຢາງ.  
ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບເມັດຕຸ່ມ ແລະ ບາດແຜ  
ບໍລິເວນກົບຕີນສັດ ເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບຕີນ ແລະ  
ຢ່າງຂາຫ້ານ.

## ການປິ່ນປົວ

### ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ:

- ເມທິແລນບລູ (Methylene blue),
- ອົກຊີບລູ (Oxy blue)



### ວິທີໃຊ້:

ສິດໃສ່ປາກ ຫຼື ທ່າບ່ອນທີ່ມີບາດແຜ 2ຄັ້ງ/ມື້

- ➔ ໃຊ້ຢາ (Negasunt)ຂ້າໜອນ  
ໃສ່ບາດເພື່ອກັນແມງວັນໄຂ່ໃສ່.



- ➔ ຕິດຕໍ່ຫາສັດຕະວະແພດບ້ານມາສັກຢາ  
ຕ້ານເຊື້ອການແຊກຊ້ອນຂອງແບກທິເຣຍ.

## ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ

ໂດຍໃຊ້ເປືອກໄມ້ທີ່ມີລິດຝາດ ຫຼື ໝາກໄມ້ປະເພດ  
ສົ້ມ ເຊັ່ນ: ເປືອກກະໂດນໂຄກ, ເປືອກໝາກ  
ຂາມປ້ອມ, ເປືອກດູ່, ເປືອກເຄືອໜາມຫັນແດງ,  
ແລະ ເປືອກໄມ້ ອື່ນໆ ເຫັນວ່າເປັນປະເພດຝາດ  
ວິທີການປຸງແຕ່ງຢາດັ່ງລຸ່ມນີ້: ເອົາເປືອກໄມ້  
ດັ່ງກ່າວໄປທຸບໃຫ້ມຸ່ນ, ຕົ້ມຂຽວ, ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ  
ແລ້ວທາໃສ່ບາດແຜຢູ່ຕີນສັດ, ປະຕິບັດ ໄປ 2-3 ມື້  
ລຽນຕິດ ອາການບາດແຜຈະດີຂຶ້ນ

