

ການຈັດການທົ່ງຫຍ້າສໍາລັບການປັບປຸງລະບົບການລ້ຽງສັດ

Eco
Friendly
Intensification &
Climate resilient
Agricultural
Systems



ໂຄງການ ລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາ

ທີ່ປັບຕົວໄປຕາມສະພາບດິນພໍ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ CIRAD ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສິກໍາ (DALaM)/ກະຊວງກະສິກໍາ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຫອງວຽງຄໍາ (ຄົງໂດກ), ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕໍ່ ປະ ເລກທີ 3310
ໂທ: (+856)021 771288 ແຟັກ: (+856)021 771288

ສະພາບລວມ

ການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາຖືວ່າເປັນອາຊີບສໍາຄັນຈາກການປູກພືດ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຕົ້ນທຶນໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄອບຄົວໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເຂດພາກເໜືອຂອງລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີການກຳລັງເສີມຈາກທາງພາກລັດ ແລະ ບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປູກຫຍ້າເພື່ອປັບປຸງທາງດ້ານອາຫານກໍ່ຄືຄຸນນະພາບຂອງການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນໃນຮູບແບບສວນຄົວ ຫຼື ລ້ຽງເປັນເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຊີ້ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຫຼາຍເຂດໄດ້ກໍານົດເອົາການລ້ຽງສັດເປັນບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍໃນການສ້າງລາຍຮັບເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຈາກການລ້ຽງສັດຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມເນື້ອທີ່ການປູກຫຍ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດການທົ່ງຫຍ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບຕໍ່ກັບສັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ.



ກ່ອນທີ່ຈະບໍລິຫານຈັດການໄດ້ຕ້ອງຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ ແລະ ຜົນຜະລິດ ພືດຫຍ້າອາຫານສັດ



ສັດໜຶ່ງໂຕຕ້ອງການຫຍ້າປຽກໃນປະລິມານ 10-15% / ວັນ/ ນໍ້າໜັກໂຕ ແລະ ຫຍ້າ ແຫ້ງ 2,5-3,5% /ວັນ/ນໍ້າໜັກໂຕ

ຕົວຢ່າງ : ຄວາມໂຕໜຶ່ງ ຫຼື ງົວໂຕໜຶ່ງໜວ້າ 300 ກິໂລມັນຕ້ອງການ ຫຍ້າແຫ້ງແມ່ນ 7 ຫາ 10 ກິໂລ ຫຼື ຫຍ້າປຽກຢູ່ 30 ຫາ 45 ກິໂລ/ວັນ

ພືດອາຫານສັດຕະກຸນຫຍ້າໃຫ້ຜົນຜະລິດມວນສານປຽກໃນລະຫວ່າງ 40 ຫາ 200 ໂຕມ/ປີ/ເຮັກຕາ


ລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ	ນໍ້າໜັກປຽກຕະກຸນຫຍ້າ (ໂຕມ/ha/ປີ)	ນໍ້າໜັກປຽກຕະກຸນຖົ່ວ (ໂຕມ/ha/ປີ)
ຕໍ່າ	20 - 40	10 - 20
ປານກາງ	40 - 100	20 - 30
ດີ	100-200	30-60

ພືດຕະກຸນຖົ່ວຈະມີທາດຊີ້ນ 15 ຫາ 25 %, ສ່ວນພືດຕະກຸນຫຍ້າມີທາດຊີ້ນ 5 ຫາ 15 % ພືດຕະກຸນຖົ່ວຈະມີຜົນຜະລິດໜ້ອຍກວ່າພືດຕະກຸນຫຍ້າ 2 ຫາ 3 ເທົ່າ

ຄວາມຕ້ອງການຫຍ້າອາຫານສັດຕາມນ້ຳໜັກຕົວຂອງສັດ

ຈຳນວນໂຕ	ນ້ຳໜັກໂຕ (ກິໂລ)	ຄວາມຕ້ອງການກິນ ຫຍ້າ ກິໂລ/ມື້		ຄວາມຕ້ອງການກິນ ຫຍ້າ ໃນ 3 ເດືອນ (ກິໂລ)		ຄວາມຕ້ອງການຫຍ້າ 1 ປີ (ກິໂລ)	
		ປຽກ	ແຫ້ງ	ປຽກ	ແຫ້ງ	ປຽກ	ແຫ້ງ
1	100	10	2.5	900	225	3,650	913
1	200	20	5	1,800	450	7,300	1,825
1	300	30	7.5	2,700	675	10,950	2,738
5	100	50	25	4,500	2,250	18,250	9,125
5	200	100	50	9,000	4,500	36,500	18,250
5	300	150	75	13,500	6,750	54,750	27,375

ຊ່ວຍໄລຍະ ແລະ ຄວາສູງທີ່ເໝາະສົມຂອງການຕັດ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ສັດກິນ



ການຕັດຫຍ້າເລື້ອຍໆຈະເປັນການປັບປຸງຄຸນນະພາບພືດອາຫານ ສັດແຕ່ຈະໄດ້ປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດໜ້ອຍ

ໄລຍະການຕັດຫຍ້າ	ປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດ (ຫຍ້າສັດໂຕມ / ha / ປີ)	ປະລິມານຂອງໄບ (% ຕໍ່ຜົນຜະລິດລວມ)	ທາດຊີ້ນ (%)	ການຍ່ອຍໄດ້ (%)
ຮອບວຽນ 3 ອາທິດ	10	60	14	60
ຮອບວຽນ 6 ອາທິດ	15	40	10	55
ຮອບວຽນ 9 ອາທິດ	20	25	7	45

ການຕັດຫຼືປ່ອຍໃຫ້ສັດກິນໃນຊ່ວງເວລາໄວເຮົາຈະໄດ້ປະລິມານທາດຊີ້ນແລະການຍ່ອຍຂອງສັດໄດ້ດີແຕ່ປະລິມານຜົນຜະລິດແມ່ນໄດ້ໜ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນຄວນຕັດຕັດປະຈຳເປັນຮອບວຽນທຸກ ໓ ຫາ 5 ອາທິດໃນຊ່ວງລະດູ ຝົນ

ຄວາສູງທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການຕັດ ຫຍ້າໃຫ້ສັດກິນ

ຕະກຸນຫຍ້າຈໍາພວກລໍາຕົ້ນ ເລືອຕາມຫນ້າດິນ: ຫຍ້າ ຮຸມິນິກລາ ຫຍ້າ ດິຕີຢອງ	ຄວາສູງສໍາລັບຕັດພືດອາຫານສັດ (cm)
ຕະກຸນຫຍ້າຈໍາພວກລໍາຕົ້ນຂະຫຍາຍຕົວທາງຕັ້ງ ຫຍ້າ ຮຸຊີ ຫຍ້າ ດິກຸມເບັນ ຫຍ້າ ບໍຣິຊຸງຕາ ຫຍ້າ ມຸລາໂຕ ຫຍ້າ ປານິກອມ ຫຍ້າ ແກມບາ ຫຍ້າ ບັດສະປາລອມ ຫຍ້າ ເນເປຍ ຫຼື ຫຍ້າ ອ້ອຍຊ້າງ	5 - 10
ຕະກຸນຖົ່ວ	10 - 30
ຖົ່ວສະຕາຍໄລ	20 - 30



ບັນຫາທີ່ພົບ ແລະ ແນວທາງໃນການປັບປຸງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ

ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຂອງພືດອາຫານສັດຈະພົວພັນເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ

ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນໃບຂອງຫຍ້າ ປານິກອມທີ່ຂາດທາດ ອາສິດ ຫຼາຍຖ້າທຽບກັບຫຍ້າ ແກມບາ

ຫຍ້າ ແກມບາ ຫຍ້າ ປານິກອມ

ພືດອາຫານສັດພາບຫຼັງປູກໄດ້ 3 ປີ ໂດຍເອົາສັດເຂົ້າກິນຕະຫຼອດແຕ່ບໍ່ມີການ ໃສ່ຜຸນຄົນໃຫ້ຈັກເທື່ອ.

ຫຍ້າ ປານິກອມ ຮຸຊີ Ruzi

ແນວທາງໃນການປັບປຸງດິນທົ່ງຫຍ້າອາຫານສັດ

- ການນໍາເອົາຜຸນຄວາມມູນສັດມາໃສ່
- ປ່ອຍສັດເຂົ້າກິນຫຍ້າຢູ່ໃນສວນ(ແຕ່ສວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ພຽງພໍ)
- ລົງທຶນຊື້ຜຸນ ວິທະຍາສາດ(ປຸຍ)ມາໃສ່ສວນພືດອາຫານສັດໃນເມື່ອມີລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍສັດແລ້ວ

ມີປະມານ 60-80 % ຂອງບັນດາທາດອາຫານ ທີ່ສັດໂຕໜຶ່ງ ໄດ້ບໍລິໂພກໄປແລ້ວ ໄດ້ກັບຄືນມາເປັນມູນສັດ ແລະ ນໍາຍ່ຽວ !!!

ສູດວັດແທກນໍ້າໜັກສັດ(ງົວ)
ນໍ້າໜັກຂອງສັດ(ກິໂລ)=ລວງຮອບເອິກຄູນກັນຂເທື່ອ(ຫົວໜ່ວຍແມັດ) x ລວງຍາວຂອງສັດ(ຫົວໜ່ວຍແມັດ)x88,4

