

ຊະນິດຢາວັກຊີນ	ອາຍຸສັດຕ້ອງໃຊ້	ວິທີໃຊ້	ໄລຍະຄຸ້ມກັນ
◆ ຢາວັກຊີນອະຫິວາສັດປົກ	◆ ໃຊ້ກັບສັດປົກທົ່ວໄປ ◆ ສັດອາຍຸ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປ.	◆ ສັກ 1 ມລ (ສັກຫຼືບໜັງ)	3 ເດືອນ

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



**ການນຳໃຊ້ຢາ
ວັກຊີນອະຫິວາສັກປົກ**

ຕາຕະລາງ : ການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນ ອະຫິວາສັກປົກ



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມໂດຍໂຄງການ:
FWC BENEFICIARIES 2013–LOT 1 RURAL DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY,
Specific Contract DCI-ASIE/2014/354910



ຄັດຈາກ: ປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ວັກຊີນສຳລັບສັດ (1997)

ຮຽບຮຽງໂດຍ :
ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ (CETWU)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :
ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)

ວັກຊີນ ອະຫິວາສັດປີກ

ນິຍາມ:

ວັກຊີນຊະນິດນີ້ ປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊື້ອ ພັນ PASTEURILLA MULTOCIDA AVIN ໃນພູມປູກນ້ຳຊີ້ນ ແລະ ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍຟອກໂມນ, ເປັນວັກຊີນເຊື້ອຕາຍຊະນິດນ້ຳ ປະສົມກັບ ອາລູມິນຽມ ໂປຕາສຊອນຊິນ ເຟດ. Aluminum Potassium Sulphate ເປັນສານເສີມພະລັງ.



ລັກສະນະອາການ


ໂກ່ຕາຍກະທັນຫັນ ໂດຍບໍ່ມີປະກົດການຂອງພະຍາດ. ສິ່ງເກດເບິ່ງໜ້າສີດຳຊ້ຳ ສະເພາະໂຕຕາຍແລ້ວ.
ຂໍ້ທີ່ສັງເກດ: ເມື່ອມີອະຫິວາເກີດຂຶ້ນ ຈະມີທັງໂກ່, ເປັດ, ໂກ່ງວງ, ຫ່ານ, ຕາຍຜ້ອມງກັນ. ເປີເຊັນການຕາຍ 30 ຫາ 50 % .

ຂໍ້ແນະນຳ


ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ ແກ່ສັກປີກທົ່ວໄປ.

ວິທີໃຊ້

ສັ່ນໃຫ້ລະລາຍດີກ່ອນໃຊ້



- ◆ ສັດປີກ ອາຍຸ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປສັກ 1 ມລ ຫຼືບໜັງ.
- ◆ ຫຼັງຈາກສັກຢາຈະມີອາການໃຕ້ເລັກນ້ອຍ. ຕາມບໍລິເວນສັກ ພາຍໃນລະຍະ 2—3 ມື້.



ຮູບ: ການສັກຫຼືບໜັງ



ໄລຍະຄຸ້ມກັນ

ສັດຈະມີຄວາມຄຸ້ມກັນ ຫຼັງຈາກສັກຢາໄດ້ 2 ອາທິດ ແລະ ຈະຄຸ້ມກັນພະຍາດອະຫິວາສັດປີກໄດ້ 3 ເດືອນ.

ການເກັບຮັກສາ

ຮັກສາໃນອຸນນະພູມ 4 ອົງສາ ກຸ້ມໄດ້ 1 ປີ. ເວລາຂົນຍ້າຍວັກຊີນ ຫຼືກວ້ວນບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ. ແລະ ອຸນນະພູມອົບເອົ້າເກີນໄປ.

ແກ້ວບັນຈຸ

ແກ້ວໜຶ່ງບັນຈຸ 50 ມລ / 50 ເຂັ້ມ.