

ກຳເນີດເຊັ່ນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຜັກເກີດການເມົາເລື້ອຍໄດ້ ສຳ
ບັດສະພິດທີ່ຂຶ້ນໃນໄລຍະທຳອິດ ຄວນກຳຈັດໂດຍ
ດ້ວຍການໃຊ້ມີຖອນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໄຫ້ຫຍ້າເກີດຫຼາຍ
ກະນົນເປັນໂຕຍາດແຍ່ງນ້ຳ ແລະ ຫາດອາຫານ.



ານໃສ່ຝຸ່ນ

ຫຼັງປູກໄດ້ 7 ວັນ ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 46-0-0 ອັດຕາ
0-0 ກລ/ໄລ່ ຫຼັງປູກໄດ້ 20-25 ວັນໃສ່ຝຸ່ນ15-15-15
ສົມກັບ 46-0-0ໃນອັດຕາ 15 ກລ/ໄລ່ ພ້ອມກັບ
ດັດສະພິດ ຫຼັງຈາກໃສ່ຝຸ່ນທຸກຄັ້ງຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳ.



ການເຕີບກຳ່ງ

ເມື່ອຜັກສະຫຼັດ ມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 40 - 60
ວັນ ຫຼັງຍ້າຍປູກໃຊ້ມິດຕັດ ແລະ ໃຫ້ເຫຼືອໂບນອກ 3
ໃບເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍໃນການເຊີນສົ່ງຫຼືກ
ລົງງານເກັບກຸ່ງຈຸດຕອນແດດຮ້ອນຄວນເກັບຕອນບາຍ
ຫຼືຄ່ຳແລ້ວເບີຍ ໃນທີ່ກິນກ່ອນນ້ຳໄປຈຳກ່ອນ.



ສະໜັບສະໜູນການຕິຝົມໂດຍ:


ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
KOPIA-Lao Center
ໂທລະສັບ: 021 360 377
ອີເມວ: thongkhounhhrc@yahoo.com

ເຕັກນິກການປູກ ສະຫຼັດລະດູຝົນ



ຮຽນຮຽງໂດຍ: ທອງສານ ສີສະໄພທອງ,
ໄມ້ດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພິດໄລັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ





ການກຽມດິນ

ໂຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 20-25 ຊມ ແລະ ວາມປູນຂາວໃນອັດຕາ 100 ກຼາມ/ມ² ຕາກແດດໄວ້ ມະຍາດ 14 ວັນ ເພື່ອຫຼ່າລາຍວັດສະພິດ, ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດສີ່ຢູ່ໃນດິນ ຈາກນັ້ນກໍ່ໂຖ ແລະ ອາດດິນໃຫ້ລະອຽດ ຮອງພື້ນດັ້ງຢູ່ນອກໃນອັດຕາ 4 ໂຕນ/ໄລ່ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 15-15-15 ແລະ ສູດ 5-5-0-0 ໃນອັດຕາ 50 ກລ/ໄລ່ ຍົກແປງ ຫຼື ໜານຜູກ ວັງງຸ່ມມານ 1 ມ ສວ່ນຄວາມ ຍາວຂອງໜານແມ່ນ ກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງພື້ນທີ່ ຍົກໜານໃຫ້ສູງເຖິງ 5-5-30 ຊມ (ຖ້າພື້ນທີ່ລະບາຍນ້ຳຍາກຄວນຍົກໜານ ຫ້ອງເຖິງ 50 ຊມ ຈຶ່ງຮ່ອງລະບ່າຍນ້ຳລະຫວ່າງໜານ ຫ້ອງປະມານ 50 ຊຕມ.

ການມຸງໝານ

ມຸງໜານໂດຍຈະໃຊ້ຜັກັ້ນແຂງມຸງ ຫຼື ຜັກຢາງ ສໃນລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການກະທົບຂອງ ມືນເມື່ອເວລາຝົນຕົກ.



ການປູກ

ໂລຍະຫ່າງຂອງການປູກ 30x30 ຊມ, ໃນຮ່ວງ ລະດູຝົນ 40x40 ຊມ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງ ພະຍາດ.



ການໃຫ້ນ້ຳ

ຄວນໃຫ້ນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພຽງພໍຕໍ່ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ການໃຫ້ນ້ຳບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍຈົນ ເກີນໄປເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮາກເນົາກໍ່ ລະບົບຝົນຕົກໃຫ້ທິດນ້ຳລ້າງທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກຝົນຝຸດ.