



**ເຕັກນິກການປູກໝາກລ່າໃຍ**

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຕັ້ກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ  
**ຂະແໜງງານໄມ້ໃຫ້ໝາກ**

ໝາກລ່າໃຍ ເປັນຝູ່ເຂດຮ້ອນ ເຂດພາກ ໃຕ້ ຂອງ  
 ປະເທດຈີນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້. ພື້ນທີ່  
 ສາມາດປູກໄດ້ ຮັບປະສິດທິພາບ ສູງ ແມ່ນໃນເຂດອາຊີ  
 ອາຄະເນ. ໝາກລ່າໃຍມີຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານໂພສະນາການ  
 ສູງ. ຊຶ່ງ ປະກອບດ້ວຍທາດຕ່າງໆ. ເປັນອາຫານເສີມ  
 ທາງດ້ານໂພສະນາການ. ນອກນີ້ ຍັງມີໃຊ້ເຂົ້າ ເປັນ  
 ວັດຖຸດິບ ປ້ອນໂຮງງານ.

- ❖ ດິນຟ້າອາກາດທີ່ເໝາະສົມ  
 ດິນລ່າໃຍ ມັກດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນຢ່ານ -ກາງ pH 5.5-  
 6.5. ປະລິມານນ້ຳຝົນ 1.200 ຫາ 1.444 ມມ/ປີ.  
 ອຸນຫະພູມ ສະເລ່ຍປະມານ 20-25 c. ຊ່ວງອອກດອກ  
 ຕ້ອງການອຸນຫະພູມ 10-12 c.
- ❖ ແນວພັນ

ແນວພັນໝາກລ່າໃຍ ມີພັນພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນ  
 ບັບປຸງຄື: ພັນປັບປຸງ: ປະຈຸບັນ ມີພັນ ອີດ, ອີ່ຫງວ, ຊິມຟຸ, ບົງວ, ຟູໂກ ແລະ ກວນຝູ.

- ❖ ການຂະຫຍາຍພັນ  
 ການຂະຫຍາຍພັນ ໝາກລ່າໃຍ ທີ່ມີປະ ສິດທິ  
 ຜົນສູງ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນນຳໃຊ້ ວິທີໂຫມງ່າ. ແຕ່  
 ໂດຍທົ່ວໄປ ການຂະຫຍາຍພັນ ມີຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ:  
 ການກັກແກ່ນ, ການສຽບເສດ, ການໂຫມງ່າ (ຕອນ),  
 ການຕິດຕາ ແລະ ອື່ນໆ.

- ❖ ການປູກ  
 ລະດູປູກ ທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນລະດູຝົນ  
 ຫາ ກາງລະດູຝົນ. ກຽມດິນໃຫ້ລະອຽດດີ. ໄລຍະ  
 ປູກ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເປົ້າຫມາຍ. ຖ້າປູກເພື່ອການ ຂະ  
 ຫຍາຍພັນ ແມ່ນ 5x5 ມ ຫຼື 6x6 ແມັດ. ແຕ່ຖ້າ  
 ປູກເພື່ອເກັບຜົນຜະລິດ ແມ່ນ 8x8 ແມັດ ຫຼື  
 10x10 ແມັດ.

- ❖ ການປົວລະບົດຮັກສາ  
 ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ເສັຍ  
 ຫຍ້າ ແລະ ໃຫ້ນ້ຳສະຫມໍາສະເໝີ. ເພາະວ່າຕົ້ນ  
 ລ່າໃຍປູກໃຫມ່ 1-3 ປີ ຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍທີ່ສຸດ.  
 ການໃສ່ຜູ້ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບ  
 ໂຕ. ລ່າໃຍຕ້ອງການຜູ້ເລັ່ງ ເພື່ອເລີ່ມສ້າງທາງໃຍ  
 ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນອັດຕາ 100-200 ກູ/ຕົ້ນ/ປີ. ຫຼັງ  
 ຈາກປີທີ່ສາມແລ້ວເລີ່ມໃສ່ຜູ້ NPK ສຸດ  
 13.13.21 ຫຼື 15.15.15 ໃນຈຳນວນ 100-  
 200 ກູ/ຕົ້ນ/ປີ.  
 ❖ ການຕັດແຕ່ງ

ຕັດແຕ່ງງ່າທີ່ມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທໍາລາຍ ຫຼື  
 ງ່າທີ່ຢູ່ໃນຊົງຟູໄມ້ໃຕ້ແສງສະຫວ່າງສອງ ເຂົ້າໄປໃນຊົງຟູມ  
 ຢ່າງຫນ້ອຍ 30%.

- ❖ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້  
 ພະຍາດ  
 ພະຍາດລາແບັງທໍາລາຍໃບອ່ອນ ແລະ ທໍາລາຍ ຫມາກ  
 ອ່ອນ.

ການປ້ອງກັນ: ໃຊ້ຢາ ອີໂນຊານ, ກູປຼາວິດ ສິດຕາມດົ້ນ  
 ໃບ.

- ❖ ແມງໄມ້:  
 ມີ ເພີຍຂາວ, ປຶງຈາະຫອບ,  
 ການປ້ອງກັນ: ໃຊ້ຢາເຊວິນ 85% ສິດຕາມ ດົ້ນໃຫ້  
 ທົ່ວ.

- ❖ ການເກັບກ່ຽວ  
 ເວລາເກັບກ່ຽວລ່າໃຍ ຢູ່ໃນປະເທດເອົາ ແມ່ນຢູ່ໃນທ້ອງ  
 ເດືອນ 7-8 ເກັບໝາກສຸກແກ້ດີ.