



ພົວພັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:

ເຮືອນເລກທີ 525, ໜ່ວຍ 41, ຊັ້ນ 4 ອາຄານສີຂຽວ ບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊ
ເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ຕູ້ ປ.ນ. 9997,
www.winrock.org

ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳໂດຍ:

Activity supported by:

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ
Creating Linkages for Expanded Agricultural Networks (CLEAN Project)



ສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ມອດເຈາະ ໝາກກາເຟ

Coffee Berry Borer

ລັກສະນະການ ທຳລາຍ

ມອດຈະເຂົ້າທຳລາຍ ໝາກກາເຟ ຕັ້ງແຕ່ໝາກກາເຟຍັງນ້ອຍ ຈົນ ເຖິງໝາກສຸກແກ່, ມອດຈະເຈາະກິ້ນຂອງໝາກກາເຟ ເປັນຮູກົມເຫັນ ຊັດເຈນ ແລະ ທຳລາຍຢູ່ທາງໃນໝາກ, ໝາກກາເຟທີ່ຖືກມອດເຈາະຈະ ເປັນທາງໃຫ້ເຊື້ອລາ, ເຊື້ອແບັກທີເລຍ ເຂົ້າທຳລາຍຊຳເຮັດໃຫ້ໝາກຫຼົ້ນ, ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໝາກກາເຟຫຼຸດລົງ.



ການລະບາດ

ມອດຈະເຈາະໝາກກາເຟ ໄລຍະເປັນໝາກອ່ອນຄືຊ່ວງເດືອນ 8 ຫາ ເດືອນ 12 ເປັນຊ່ວງເວລາໝາກກາເຟ ອ່ອນຈົນຮອດໝາກກາເຟສຸກ.



ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ

1. ສຳຫຼວດຕິດຕາມພື້ນທີ່ປູກກາເຟ ເປັນປະຈຳ.
2. ອານາໄມພື້ນທີ່ປູກໂດຍການກຳຈັດວັດສະພືດ, ເກັບໝາກທີ່ສຸກ ຫຼື ແຫ້ງ ຢູ່ເທິງຕົ້ນ ແລະ ໜ້າດິນ ທີ່ມອດທຳລາຍນຳໄປຝັງດິນ ຫຼື ໄປ ເຜົາໄຟທຳລາຍນອກພື້ນທີ່ການຜະລິດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ ລະບາດ.
3. ຕັດແຕ່ງກິ່ງງ່າ ແລະ ຊົງຟຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ກາເຟໄດ້ຮັບແສງພຽງພໍ ແລະ ສາມາດລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.
4. ຫຼີກລ້ຽງການຕາກໝາກກາເຟສຸກ ບໍລິເວນພື້ນທີ່ການຜະລິດ ແລະ ພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ.
5. ວາງກັບດັກ ຟີລາໂມນ ເມທິລແອກໍຣິ (Methyl Alcohol): ເອທິລແອກໍຣິ (Ethyl Alcohol) ອັດຕາ1:1) 5-10 ຈຸດ/ໄລ່ ແລະ ຕື່ມ ເຟລາໂມນ ທຸກໆ 14 ວັນ.
6. ໃຊ້ກ້ານ ຫຼື ໃບຢາສູບແຫ້ງໂຮຍບາງໆ ອ້ອມຮອບຕົ້ນ ໃນອັດຕາ 1 ກິໂລກຼາມ/ຕົ້ນເພື່ອຂັບໄລ່ໂຕແກ່ຂອງມອດ.
7. ນຳໃຊ້ເຊື້ອ ບູເບີເລຍ ບ່າເຊຍນ່າ (Beauveria bassiana) ອັດຕາ 1 ກິໂລກຼາມ /ນ້ຳ 20 ລິດ (ສິດໄລຍະກາເຟເປັນໝາກ ອ່ອນ ເດືອນ ມີນາ-ກັນຍາ ເປັນຊ່ວງໄລຍະມອດ ເຈາະບໍ່ເລີກ) ສິດ 2 ອາທິດ/1 ຄັ້ງ.
8. ໃຊ້ຢາເຄມີຂ້າແມງໄມ້ ເຊັ່ນ: ຄາໂບຊັນແຟນ (Carbosulfan) 50% EC ອັດຕາສ່ວນ 80-95ຊີຊີ/ນ້ຳ 20 ລິດ (ສິດຊ່ວງ ໄລຍະກາເຟເປັນໝາກອ່ອນ ເດືອນ ມີນາ- ກັນຍາຊຶ່ງເປັນໄລຍະ ມອດເຈາະບໍ່ເລີກ) ສິດ 2 ອາທິດ/1 ຄັ້ງ.