

ການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງ



ໂດຍ: ອ.ຈ ວັນສີ ປະຖົມມະວົງ
ຜູ້ລຽບລຽງ: ອ.ຈ ໂພໄຊ

ການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງ

1. ຂໍ້ຄວນຄຳຟັງໃນການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງ


- 1.1 ບັນດີ.
- 1.2 ອາຫານດີ
- 1.3 ບ້ອງກັນດີ
- 1.4 ບໍລິການດີ.
- 1.5 ຕະຫຼາດດີ

2. ສະຖານທີ່ລ້ຽງໄກ່

ແຕ່ກ່ອນຊາວບ້ານເຄີຍລ້ຽງໄກ່ໂດຍເຮັດລຶກໄກ່ໄວ້ກ້ອງຕະລ່າງ, ກ້ອງເລົ້າ ຫຼື ກ້ອງຮິມໄມ້ ແຕ່ມັກຈະມີບັນຫາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ເມື່ອເຫັນວ່າເປັນແນວນັ້ນຈຶ່ງມີການປ່ຽນ, ໄປປຸກລຶກໄກ່ຢູ່ ໄກ່ເຮືອນ, ລຶກໄກ່ຄວນສ້າງຢູ່ບ່ອນດິນສູງນ້ຳບໍ່ຖ້ວມ, ມີແສງແດດສ່ອງ, ມີລົມພັດຜ່ານໄດ້ດີ, ມີນ້ຳ ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານ, ໄກ່ຂຸມຂຸມ.

3. ລັກສະນະຂອງລຶກໄກ່

- 3.1 ສ້າງດ້ວຍວັດຖຸທີ່ຊອກໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ປະຢັດທຶນ, ທຶນຫານ.
- 3.2 ຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍວັດຖຸທີ່ຊອກໄດ້ງ່າຍໃນ ທ້ອງຖິ່ນ, ກັນຝົນ ກັນແດດໄດ້ເຂັ້ມ: ຫຍ້າຄາ, ຫຍ້າແຜກ, ຝ້າ.....
- 3.3 ມີປະຕູເຂົ້າ - ອອກສູງໃຫ້ຄົນເຂົ້າ - ອອກໄດ້ ສະບາຍ ແລະ ຕ້ອງມີປະຕູນ້ອຍສຳລັບໄກ່ ແລ່ນເຂົ້າ - ອອກ ຂະໜາດພໍດີກັບໄກ່ ເຂົ້າ - ອອກໄດ້ເທື່ອລະໂຕ. (ເພື່ອສະດວກໃນ ການນັບ ແລະ ກວດກາໄກ່).
- 3.4 ຝາລອກໄກ່ເອ້ມດ້ວຍວັດຖຸທີ່ຊອກໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ງ່າຍເຂັ້ມ: ໄມ້ໄຜ່, ຝານິຍແຕ່ ພື້ນເຖິງເອວຄວນເອ້ມ ໃຫ້ຕຶບ ເພື່ອປ້ອງກັນລົມພັດ, ສ່ວນຝາແຕ່ພຽງແອວຂຶ້ນໄປ ເຖິງຫຼັງຄາຄວນເອ້ມຫ່າງ ເພື່ອໃຫ້ລົມພັດຜ່ານໄດ້, ແສງສະຫວ່າງກໍ່ສ່ອງໄດ້ບາງເວ ລາແຕ່ ສາມາດປ້ອງກັນສັດທີ່ເຂົ້າມາລົບກວນໄກ່ໄດ້ເຂັ້ມ: ງູ, ເຫງັນ, ໝາ



- 3.5 ມີຄອນໃຫ້ໄກ່ນອນຊຶ່ງເຮັດດ້ວຍໄມ້ໃຜກໍມີສະໜາດພິດກັບຕົນໄກ່ຈັບໄດ້, ຖ້າເຮັດຄອນຫຼາຍຕົ້ນຄວນໃຫ້ສູງລະດັບດຽວກັນ. ຖ້າເຮັດຄອນສູງຫຼາຍຄອນເຮັດຂຶ້ນໄດ້ໃຫ້ໄກ່ໂຕນ້ອຍໄດ້ຂຶ້ນໄດ້.
- 3.6 ມີຮອກໄຂ່ໄວ້ຄືບຈຳນວນແມ່ໄກ່, ຮອກໄກ່ສ່ວນຫຼາຍຈະເຂົ້າກະຕ່າ ຫຼື ເອົາໄມ້ປ່ອງມາສານເປັນກະຕ່າ.
- 3.7 ໃນລຶກໄກ່ຄວນຈັດໃຫ້ມີມູມທີ່ຕືບເປັນລັກສະນະຕູບນ້ອຍ (ທ້ອງນ້ອຍ) ທີ່ສາມດ້ວຍແຕະໜາຊຶ່ງຈັດໃຫ້ໄກ່ແມ່ລູກອ່ອນ ແລະ ລູກນອນ, ໄກ່ແມ່ລູກອ່ອນ ແລະ ລູກຈະນອນຢູ່ພື້ນດິນເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບໍ່ໃຫ້ສັດເຂົ້າລົບກວນ.
- 3.8 ພື້ນລຶກໄກ່ຄວນເປັນດິນອັດແໜ້ນພຽງສາມາດກວາດເອົາຂີ້ໄກ່ອອກມາເຮັດຝຸ່ນບໍ່ໄດ້ງ່າຍ, ບໍ່ຄວນຮອງດ້ວຍແກບ ເພາະແກບຈະຊຶ້ງເຂົ້າຕາໄກ່. ແກບມັກຈະເກີດໂຮໃນລຶກໄກ່.
- 3.9 ບໍລິເວນພື້ນລຶກໄກ່ຕ້ອງເປັນເດີ່ນກວ້າງດິນອັດແໜ້ນ ເພື່ອເຮັດເປັນເດີ່ນໃຫ້ອາຫານ ແລະ ຄວນມີພາຊະນະໃສ່ອາຫານ.
- 3.10 ຄ້ອມຮອບລຶກໄກ່ບໍ່ຄວນມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຫຼາຍເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມືດ, ລົມຫັດຜ່ານບໍ່ສະດວກ.
- 3.11 ຕາມສາຍຄາລຶກໄກ່ຕ້ອງມີຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຝົນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຝົນໄຫຼເຂົ້າລຶກ, ຖ້າພື້ນລຶກຊຸ່ມຈື່ນຈະມີລ່ວນໃຫ້ໄກ່ເປັນຫວັດໄດ້ງ່າຍ.
- 3.12 ທິດຂອງລຶກໄກ່, ຖ້າເປັນລຶກນ້ອຍຫັ້ນໄປທິດໃຕ້ກໍໄດ້, ແຕ່ຖ້າລຶກໃຫຍ່ຄວນຫັ້ນສືບນ້ຳໄປຕາມທາງຕາເວັນອອກ ຫຼື ຕົກກໍໄດ້.

4. ພື້ນໄກ່

ໄກ່ພື້ນເມືອງ (ໄກ່ລາດ) ທຸກພັນຈະຕົວພິດຊຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ລ້ຽງ, ໄກ່ເຂດໜາວກໍ່ເໝາະສົມກັບເຂດໜາວບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະລ້ຽງຢູ່ເຂດຮ້ອນ, ໄກ່ທີ່ງ່າງບໍ່ສົມຄວນຈະເອົາໄປລ້ຽງຢູ່ເຂດຫຼຸດອຍ.

ກ. ລັກສະນະຂອງໄກ່ທີ່ດີ.

- 1. ແຂງແຮງດີ.
- 2. ຕາກິນເກັ່ງ
- 3. ແຕ່ພັນດີ. (ຂະຫຍາຍພັນດີ, ໄຂ່ຫຼາຍ, ພັກໄຂ່ເປັນ, ລູກຫຼາຍ)
- 4. ລ້ຽງລູກເກັ່ງ.
- 5. ກິນໜ້ອຍແຕ່ໃຫຍ່ໄວ.

ຂ. ປະເພດໄກ່:

- 1. ໄກ່ແຈ້ 4 - 4,5ເດືອນເລີ່ມໄຂ່.
- 2. ໄກ່ກາງ 5ເດືອນເລີ່ມໄຂ່.
- 3 ໄກ່ໃຫຍ່ 6ເດືອນເລີ່ມໄຂ່.

ຄ. ລັກສະນະຂອງໄກ່:

- 1. ໄກ່ເຂດໜາວເທິງພູດອຍເປັນໄກ່ພັນໃຫຍ່ມີຂົນດຶກໜາ, ໂຕໃຫຍ່ ຫາກົນຕາມປາຕາມດົງກົນມັດ, ແມງ, ໄຮ, ປວກ, ບິ້ງ, ຂີ້ກະເດືອນ.
- 2. ໄກ່ເຂດສ້ອມ - ທົ່ງພຽງ ເປັນໄກ່ພັນກາງຂົນໜ້ອຍ (ຂົນບາງ) ແຫຼ່ງຫາກົນມີຕຼາຍ, ໄກ່ຈຳພວກນີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກໄກ່ປາມາເປັນໄກ່ບ້ານ.
- 3. ໄກ່ແຖວຊາຍປາ ພັນໄກ່ແຈ້ (ບ້ານນາແຄມໂຄກ ຫຼື ປ່າໜ້ອຍ) ໂຕໜ້ອຍ, ຈ່ອຍ, ຮຽວ ເຊັ່ນ: ໄກ່ແຈ້.
ການເລືອກພັນໄກ່ມາລົງງູນັ້ນສຸດແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ, ແຕ່ຕ້ອງເລືອກພັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນເອງ.

5. ການກຽມສະຖານທີ່ກ່ອນເອົາໄກ່ມາລົງງູ.

- 5.1 ຕ້ອງຊື້ໄກ່ຢູ່ບ່ອນບໍ່ມີພະຍາດລະບາດໃນບ້ານນັ້ນມາກ່ອນ.
- 5.2 ຊື້ໄກ່ພໍ່ພັນແມ່ພັນຄວນມາຈາກຕ່າງຖິ່ນຕ່າງໝູ່ບ້ານກັນເພື່ອຈະໄດ້ລູກໄກ່ທີ່ດີ, ຖ້າພໍ່ພັນແມ່ພັນມາຈາກສາຍເລືອດໃກ້ຊິດກັນຈະໄດ້ລູກໄກ່ທີ່ອ່ອນແອ.
- 5.3 ກ່ອນນຳໄກ່ເຂົ້າມາລົງງູຕ້ອງກຽມລຶກໄກ່ໃຫ້ສະອາດ, ນ້ຳທີ່ໃຫ້ໄກ່ກິນຄວນປະສົມນ້ຳສະກັດຊີວະພາບເລືອເຂົ້າຮີ້ອັດຕາສ່ວນ 1ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳ 10ລິດ ໃຫ້ໄກ່ກິນນ້ຳກ່ອນ 1ຊົ່ວໂມງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໃຫ້ອາຫານ.

6. ການລົງງູໄກ່ໜ້ອຍ.


ຫຼັງຈາກໄກ່ເປາະອອກຈາກນ້ຳໄດ້ 24ຊົ່ວໂມງແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ກິນອາຫານ, ຖ້າເອົາຫານໃຫ້ກິນອາຫານໂລດ, ໄກ່ໜ້ອຍອາດຈະເຈັບໜ້ອງ. ບໍລິເວນລົງງູໄກ່ໜ້ອຍຄວນແຍກອອກຕ່າງຫາ.

ການລົງງູໄກ່ໜ້ອຍ 2ວິທີ


- 1. ໃຫ້ແມ່ໄກ່ລົງງູ.
- 2 ແຍກເອົາໄກ່ໜ້ອຍໄປລົງງູຕ່າງຫາກ.

ການໃຫ້ແມ່ໄກ່ລ້ຽງເອງບໍ່ເປັນພາລະຕໍ່ຜູ້ລ້ຽງ, ແຕ່ຈຳນວນຄັ້ງການໂຂ່ຂອງແມ່ໄກ່
 ຈະບໍ່ມີຫຼາຍຕໍ່ປີ, ຖ້າເຮົາແຍກໄກ່ມີອາຫານລ້ຽງຕ່າງຫາກຈະເພີ່ມວຽກໃຫ້ແກ່ຜູ້ລ້ຽງແຕ່ແມ່ໄກ່ຈະ
 ອອກໂຂ່ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ປີ

6.1 ການໃຫ້ແມ່ໄກ່ລ້ຽງເອງສຸ່ມໄກ່ແມ່ລູກອ່ອນຕ້ອງເຮັດ:




ຖ້າໄກ່ເບາະ 3 - 4 ແມ່ຂຶ້ນໄປ




ຢ່າລົມນ້ຳໃຫ້ໄກ່ກິນຕ້ອງ ໃສ່ນ້ຳທະກັດຊິວະພາບເທື່ອເຂົາຮໍຕາມອັດຕາສ່ວນຂ້າງເບິ່ງ

- ເຕົາອົບໄກ່ນ້ອຍ (ເຕົາໄຟຝັງ)

ລະດູໜາວຄວນມີເຕົາອົບໄກ່ນ້ອຍຊ່ວຍ
ກະປ່ອງນົມຝຸ່ນ




ນອກນ້ຳຍັງມີ




ການສ້າງເກດຄວາມໝາຍລົມອຸ່ນນະໂນມຂອງການອົບຂອງໄກ່ນ້ອຍ

- ຖ້າໄກ່ນ້ອຍເຂົ້າໄປໃກ້ເຕົາສະແດງວ່າໄຟອ່ອນຕ້ອງໄຂຮູອາກາດເພີ່ມ.
- ຖ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ກະແຈກກະຈາຍທົ່ວໄປສະແດງວ່າຄວາມຮ້ອນພໍດີ.
- ຖ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ໃກ້ເຕົາອົບສະແດງວ່າຮ້ອນເກີນໄປຄວນປິດຮູລະບາຍຄວາມຮ້ອນບາງຮູໄດ້.




ພາສະນະໃສ່ອາຫານໄກ່ນ້ອຍ:

ຍັງໄມ້ໄຜ່, ໄມ້ຫາງ ... (ຂະໜາດບໍ່ໃຫ້ໃຫຍ່)



ພາສະນະໃສ່ອາຫານໃຫ້ໄກ່ນ້ອຍ:

ຍັງໄມ້ໄຜ່



ເມື່ອໄກ່ນ້ອຍແຂງແຮງ (ອາຍຸປະມານ 7ວັນ) ກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແມ່ໄກ່ໜາລູກໄປຊອກກິນເອງ, ຕໍ່ມາເມື່ອໄກ່ນ້ອຍອາຍຸ 1ເດືອນ ຄວນແຍກແມ່ ແລະ ລູກຈັບແມ່ໄກ່ໃສ່ສູ່ມໃຫ້ໄກ່ນ້ອຍໄປຊອກກິນເອງ, ໄກ່ນ້ອຍໄປຊອກກິນ 2 - 3ວັນກໍ່ຈະລືມແມ່, ແມ່ໄກ່ເລີ້ມປະລືມພັນ ແລະ ອອກໄຂ່ສູ່ນຕໍ່ໄປ (ຖ້າເອົາໄກ່ລູກຊຶ່ງໃສ່ນ້ຳຢັ້ງເປັນການດີ).

6.2 ການລ້ຽງລູກໄກ່ເອງ.

1. ທຳຄວາມສະອາດລຶກໄກ່ດ້ວຍການສົດພື້ນນ້ຳສະກັດຊີວະພາບລ່ວງໜ້າ 2 - 3ວັນ.
2. ກຽມເຄື່ອງອົບໄກ່ໄວ້ກ່ອນ 1ຊົ່ວໂມງ.
3. ເຮັດຮົ່ວອ້ອມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄກ່ນ້ອຍອອກໄກ່ເຄື່ອງອົບ, ພໍດີກັບຈຳນວນໄກ່.
4. ເອົາໄກ່ນ້ອຍທີ່ເບາະແລ້ວ 1ວັນມາຢູ່ໃນຮົ່ວຂອງເຄື່ອງອົບ.
5. ຂອນໄກ່ນ້ອຍກິນນ້ຳເທື່ອລະໂຕ (ຄ່ອຍຄົມຫົວລົງ).

6. ເອົາແຜ່ນເຈ້ຍ ຫຼື ລັງກະສີຂອງອາຫານແລ້ວໃຫ້ໄກ່ນ້ອຍສັບມີສຽງດັງໂຕອື່ນກໍຈະມາກິນຄືກັນ.
7. ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງສັງເກດເຄື່ອງອົບເລື້ອຍໆເພື່ອໃຫ້ໄກ່ນ້ອຍມີຄວາມອົບອຸ່ນເໝືອນກັບຢູ່ນ້ຳແມ່ຂອງມັນ.

ອາຫານຂອງໄກ່ນ້ອຍ:

1. ບຶງ, ແມງໄມ້, ປວກທີ່ຕາຍແລ້ວ, ຕັກແຕນ (ອາຫານປະເພດຊີ້ນ).....
 2. ເຂົ້າປຽນ (ເຂົ້າປາຍ) ໝາກຫຍ້າ (ອາຫານປະເພດແປ້ງ).....
 3. ບັກສິດ, ຫຍ້າສິດ, ໝາກໄມ້ສຸກ (ອາຫານປະເພດວິຕາມິນ).....
 4. ຖ້າໃຫ້ອາຫານສຳເລັດຄວນລິດລົງເລື້ອຍໆເພື່ອສອນໃຫ້ໄກ່ໄດ້ຊອກກິນເອງ.
8. ກ່ອນປ່ອຍໄກ່ 7ມື້ໃຫ້ສອນໄກ່ອອກຊອກຫາກິນ ຄ່ອຍຫຍັບອາຫານ ແລະ ນຳອອກໄກ່ຈາກບ່ອນເກົ່າ ແລະ ຄ່ອຍຫວ່ານອາຫານລົງພື້ນດິນ ຫຼື ໃນປ່າຫຍ້າ.

*** ໄກ່ແບ່ງອອກເປັນ 3ຊຸ່ນ ***

1. **ໄກ່ນ້ອຍ:** ຄືໄກ່ເລີ່ມແຕກຈາກປີ້ 1,5ເດືອນ (45ວັນ).
2. **ໄກ່ຊຸ່ນ:** ຄືໄກ່ທີ່ມີອາຍຸ1,5ເດືອນ (45ວັນ) - 4ເດືອນ (120ວັນ).
3. **ໄກ່ໃຫຍ່:** ຄືໄກ່ທີ່ມີອາຍຸ 4ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

7. ເວລາໃຫ້ອາຫານໄກ່ (ເກືອໄກ່).

- 7.1 ເກືອໄກ່ຕອນແລງ, ຕອນເຊົ້າໃຫ້ໄກ່ໄປຊອກກິນເອງ, ຖ້າເຮົາເກືອໄກ່ຕອນເຊົ້າຈະເຝິກມີໄສປ່ຽນໃຫ້ໄກ່, ໄກ່ຈະລົນລຽນຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຮືອນບໍ່ໄປຊອກກິນເອງຖ້າກິນນ້ຳແຕ່ເຈົ້າຂອງ.
- 7.2 ເວລາປ່ອຍໄກ່ຕອນເຊົ້າຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງນັບຈຳນວນເພາະໄກ່ອອກເທື່ອລະໂຕ. (ເປັນການກວດກາເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການເສຍ, ເຈັບ, ຕາຍຂອງໄກ່).
- 7.3 ການເກືອໄກ່ຕອນແລງແມ່ນການເຝິກແອບບໍ່ໃຫ້ໄກ່ໄປຫາກິນໄກ່ຫຼາຍ, ຄືຈຸບຄຳແລ້ວໄກ່ຈະຟ້າວກັບເພາະຢ້ານບໍ່ທັນກິນອາຫານນ້ຳໝູ່.
- 7.4 ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງສັງເກດວ່າ: ຖ້າໝຽງໄກ່ໃຫຍ່ຈຶ່ງແມ່ນໄກ່ອື່ມແລ້ວຖ້າໄກ່ກິນບໍ່ອື່ມໃຫ້ເກືອເພີ່ມ ແລະ ກວດເບິ່ງແຫຼ່ງອາຫານ.

8. ແຫຼ່ງອາຫານໄກ່

ຕາມທຳມະຊາດ, ທົ່ງນາ, ຄວນ, ປ່າ ດ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີອາຫານຂອງໄກ່ພຽງພໍ ດ້ວຍການປ່ຽນປ່າ, ປ່ຽນປ່າ, ປູກພືດທີ່ຄົນກິນໄດ້ ແລະ ກິນປ່ຽນໄດ້, ອາຫານຈຳພວກແປງເຊັ່ນ ສາລີ, ມັນ, ເລືອກ ຄວນປູກໄວ້ເພື່ອໃຫ້ໄກ່ໄດ້ຊອກກິນໄດ້, ຕາມປ່າພ້ອມແຄມນາຄວນຈາກເປັນທາງຈິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໄກ່ທາກັນສະດວກ ໝາຍວ່າໃຊ້ທຳມະຊາດໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.


ສິ່ງສຳຄັນນຳດ້ອງມີບໍ່ຂາດຢູ່ຕາມຈຸດທີ່ດ້ອງການໃຫ້ໄກ່ໄປຊອກກິນ, ເວົ້າລວມແລ້ວຖ້າລ້ຽງ ໄກ່ພັນເມືອງຕ້ອງເບິ່ງສະຖານທີ່ລ້ຽງ 10 ຕາແມັດຕໍ່ໄກ່ 1 ໂຕເທົ່ານີ້ກໍພໍແລ້ວ.

9. ການຟັກໄຂ່

ການຟັກໄຂ່ຖ້າປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຈະຂະຫຍາຍພັນໄກ່ໄດ້ຫຼາຍ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນໃຫ້ແມ່ ໄກ່ຟັກໄຂ່ພ້ອມກັນ 4 - 5 ແມ່ເຮົາຈະເສຍເວລາດູແລພຽງສິ່ງດຽວໄດ້ໄກ່ນ້ອຍເກືອບ 50 - 60 ໂຕ ເຮັດໃຫ້ກຸ້ມຄ່າຂອງການເຮັດວຽກ.

9.1 ຮອກໄຂ່ (ຮັງໄຂ່) ໃຊ້ກະຕ່າໄມ້ມັດຕິດແໜ້ນ, ຮອງດ້ວຍເສດຕ້ານຖືກປັບໃຫ້ເປັນ ບ່ອນຫຼຸບໄຂ່ຈະແຕກງ່າຍ, ຖ້າແບນໂພດກໍຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ກຶ້ງອອກ, ຖ້າຮອງດ້ວຍ ຫຍ້າເຜືອງຈະເກີດໄຂ, ປາກຮອກໄກ່ເອົາເວົ້າເສດພັນໃສ່ເພື່ອເຊັດຕົນໄກ່ກ່ອນເຂົ້າ ຟັກໄຂ່ ແກ້ອອກທຳຄວາມສະອາດໄດ້.

9.2 ເຕັກນິກການຟັກໄຂ່ໄກ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລູກໄກ່ອອກເທື່ອລະຫຼາຍພ້ອມກັນ.



- 9.2/1. ເກັບໄຂ່ທຸກວັນໝາຍດ້ວຍສົ່ງ ບອກຊື່ແມ່ໄກ່, ວັນ, ເດືອນ ປີ.
- 9.2/2. ເອົາໄຂ່ວາງໄວ້ບ່ອນອ່ອນນຸ້ມ, ລົມພັດຜ່ານໄດ້, ບໍ່ປົກປິດ ແລະ ພັກມື້ລະ ເທື່ອທຸກວັນ.
- 9.2/3. ເອົາວັດຖຸຄ້າຍຄືໄຂ່ໄປວາງໃສ່ແທນໃນຮອກໄຂ່.
- 9.2/4. ຖ້າມີແມ່ໄກ່ໂຕໃດຜັກກ່ອນໃຫ້ຜັກໄຂ່ບ່ອມຖ້າ, ຖ້າມີຮອດ 4 - 5ແມ່ແລ້ວ ຈຶ່ງໃຫ້ມັນຜັກພ້ອມກັນ.
- 9.2/5. ໄກ່ແມ່ໜຶ່ງຈະຜັກ 10 -15ໜ່ວຍ, ຜັກ 21ວັນຈະເບາະ, ຖ້າກາຍ 23ວັນໄກ່ ມ້ອຍຈະບໍ່ສົມບູນ.
- 9.2/6. ຖ້າເປືອກໄຂ່ບາງສະແດງວ່າແມ່ໄກ່ຂາດທາດແຄລຊຽມ, ຄວນຊອກເປືອກ ຫອຍ, ປູ ບິດລະອຽດໃຫ້ກິນ.
- 9.2/7. ຖ້າແມ່ໄກ່ໂຕໃດກິນໄຂ່ຕົນເອງສະແດງວ່າເປັນໂລກປະສາດ ຫຼື ຂາດທາດ ຊື່ນ ຫຼື ບ່ອນຜັກໄຂ່ຮ້ອນເກີນໄປ.
- 9.2/8. ເວລາແມ່ໄກ່ໜວຍຜັກໄຂ່ໃຫ້ຕຽມ ເຂົ້າອາຫານໄວ້ໃຫ້ແມ່ໄກ່ໃກ້ໆຮັ່ງຜັກ ໄຂ່.
- 9.2/9. ແມ່ໄກ່ຜັກໄຂ່ຈະພັກໄຂ່ເອງຕາມທຳມະຊາດ.

10. ພໍ່ແມ່ພັນໄກ່.

- ພໍ່ພັນທີ່ດີ:
- 1. ພໍ່ພັນ 1ໂຕຕໍ່ແມ່ພັນໄກ່ 10ໂຕ ແຕ່ດີທີ່ສຸດ 5 - 8ໂຕ ແລະ ບໍ່ຢູ່ ນຳໄກ່ແມ່ໂຕດຽວ.
 - 2. ພໍ່ພັນເຮັດວຽກໄດ້ 1ປີ ຄວນຊອກພໍ່ພັນໃໝ່ມາປ່ຽນ.
 - 3. ບໍ່ເປັນພະຍາດຂີ້ຂາວ.

- ແມ່ພັນທີ່ດີ:
- 1. ເວລາຝັບອາຫານແລ້ວຈະຈຶກອາຫານຮ້ອງລູກມາກິນ.
 - 2. ເວລາຂວັດເຂັບອາຫານຈະບໍ່ຂວັດຕົນ, ຂີ້ເຫຍື້ອໃສ່ລູກ.
 - 3. ເວລາເຈົ້າຂອງມາເກືອຈະຮ້ອງລູກມາກິນພ້ອມກັນ.
 - 4. ສາມາດພິປົກປ້ອງກັນ (ຕຸ້ມ) ລູກໄດ້ໝາຍວ່າປົກໃຫຍ່ກວ້າງ.
 - 5. ບໍ່ມີປະຫວັດເປັນໂລກຂີ້ຂາວ.

11. ການປ້ອງກັນພະຍາດ.

11.1 ປັດກວາດລຶກໄກ່ໃຫ້ສະອາດມື້ລະຄັ້ງ, ສົດພິ່ນນຳສະກັດຊີວະພາບໄລ່ແຜງ ນຳ 1ລິດຕໍ່ນຳສະກັດຊີວະພາບ ແລະ ນຳຝາສູບແນວລະ 1ບ່ວງແກງ, ສົດພິ່ນ, ພິ່ນ, ຝາ, ເພດານ, ຫຼັງຄາດ້ານໃນ, ອ້ອມຂ້າງລຶກໄກ່, ເດີນບ່ອນເກືອໄກ່.

- 11.2 ຂົນຂີ່ໄກ່ອອກຈາກລົກທຸກເຊົ້າເພື່ອເອົາມາເຮັດຝຸ່ນປົ່ມ, ຖ້າເຫັນວ່າມີໄຮໃຫ້ເອົາມາປະສົມຢາສູບສິດພິ່ນ.
- 11.3 ນໍ້າດື່ມຂອງໄກ່ໃຫ້ປະສົມນໍ້າລະກັດຊື່ວະພາບເທື່ອເຂົ້າຮູ້ທຸກວັນ.
- 11.4 ໃຫ້ໄກ່ອາບນໍ້າ (ໃຫ້ໄກ່ເກືອກຝຸ່ນ): ຈັດບໍລິເວນອາບນໍ້າຕ່າງຫາກນໍ້າທີ່ຈະອາບໃຫ້ໄກ່ມີສ່ວນປະສົມດັ່ງນີ້:
 - 1. ບູນຂາວ 1ສ່ວນ.
 - 2. ຂີ້ເທົ່າ 1ສ່ວນ.
 - 3. ຊາຍ 10ສ່ວນ.
 ທັງສາມຢ່າງນີ້ປະສົມກັນໄວ້ອ່າງ ຫຼື ຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ໄກ່ໄປນອນເກືອກເອົາຈະເຮັດໃຫ້ໄຮ ແລະ ເຫືາອອກໜີ້.

12. ໂລກທີ່ເຄີຍເກີດກັບໄກ່

12.1 ພະຍາດເສັ້ນດ້າຍ:

ອາການທີ: ໄກ່ມີນໍ້າຕາໄຫຼຕາປຽກ ຊຶ່ງເກີດຈາກແມງສາບເປັນໂຕນໍ້າພະບາດ ແລະ ຊຶ່ງປຸ່ນເຂົ້າໆ, ວິທີຮັກສາໃຫ້ເສັ້ນຕາໄກ່ດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ຫຼື ໃສ່ນໍ້າມັນຄົນ, ອະນາໄມລຶກໄກ່ທຸກວັນ, ແຍກໄກ່ໂຕທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນໄວ້ຕ່າງຫາກ.

12.2 ພະຍາດລຳໂຕ້:

ໄກ່ຄວນມີການຖ່າຍທ້ອງຈາກສະໝຸນໄພຂົ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- ກ. ແກ່ນໝາກຄຽງ 1ໜ່ວຍຝັກເປັນຂັ້ນນ້ອຍໆໃຫ້ໄກ່ກິນໆໄດ້ 5ໂຕໃຫ້ກິນທຸກເດືອນ.
- ຂ. ແກ່ນໝາກກະຖິ່ນແຫ້ງ 1ປ່ວງກາເຜປະສົມອາຫານໃຫ້ໄກ່ກິນ 1ໂຕເດືອນລະເທື່ອ.

12.3 ນິວຄາເສັ້ນ:

ອາການຂໍ້ຂຽວ, ເຫງົາ, ຄໍຍິດ, ບໍ່ຄຽງກັນດ້ວຍວິທີໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຊຶ່ງມີຫຼາຍຊະນິດຄື: ຊະນິດຢອດດັງ, ຕາ, ຊະນິດລັກ, ຊະນິດລະລາຍນໍ້າໃສ່ອາຫານໃຫ້ໄກ່ກິນ, ວັກຊີນສຳລັບໄກ່ຮຸ່ນຂຶ້ນໄປເອີ້ນວ່າ ວັກຊີນເຊື້ອເປັນ ຫຼື ເຊື້ອແກ່. ວັກຊີນສຳລັບໄກ່ນ້ອຍເອີ້ນວ່າວັກຊີນເຊື້ອຕາຍ ຫຼື ເຊື້ອອ່ອນ.

ວິທີໃຊ້: ໄກ່ນ້ອຍອາຍຸ 1 - 7ວັນ ໃຊ້ວັກຊີນເຊື້ອອ່ອນ, ໄກ່ອາຍຸເດືອນ ເຄິ່ງ ໃຊ້ວັກຊີນປ້ອງກັນນິວຄາເຊັນເຊື້ອແກ່ ຫຼັງຈາກໃຊ້ຄັ້ງທຳອິດແລ້ວຕໍ່ໄປອີກທຸກໆ 6ເດືອນ ຫຼື 1ປີຈຶ່ງໃຊ້ອີກ.

ວິທີປຸງ:

1. ນຳເອົາວັກຊີນທີ່ຊື້ມານັ້ນເກັບໄວ້ໃນກະຕິກນ້ຳກ້ອນ.
2. ເວລາຢອດໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນໂດຍການຕົ້ມໃຫ້ຮ້ອນປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້.
3. ຫ້າມໃຊ້ກັບຝຸງໄກ່ທີ່ກຳລັງເຈັບປ່ວຍ.
4. ຢາທີ່ປະສົມແລ້ວໃຫ້ຮີບໃຊ້ພາຍໃນ 1ຊົ່ວໂມງ.
5. ອຸປະກອນເມື່ອໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ທຳລາຍໂດຍເຕົາຖິ້ມ.

ສະໝຸນໄພທີ່ໃຊ້ປ້ອງກັນ ແລະ ປົວນິວຄາເຊັນ.

ນອກຈາກນ້ຳສະກັດຊີວະພາບເຄືອເຂົ້າສໍ່ປະສົມນ້ຳໃຫ້ໄກ່ກິນທຸກວັນແລ້ວ ຍັງມີສະໝຸນໄພຊະນິດອື່ນທີ່ຊອກຫາງ່າຍຄື:

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. ເຄືອເຂົ້າສໍ່ | 1 ຊໍ້ມື. |
| 2. ເຄືອຕັກຂະ | 1 ຊໍ້ມື. |
| 3. ຕົ້ນລາຊາບີ | 1 ຊໍ້ມື. |
| 4. ຂົມກະເວົ້າ | 1 ຊໍ້ມື. |

ນຳເອົາທຸກຢ່າງມາຕຳ, ຍົບເອົາແຕ່ນ້ຳ ປ້ອນເຂົ້າປາກໄກ່. ອັດຕາສ່ວນນ້ຳໃຫ້ໄກ່ກິນໄດ້ນຶ່ງໂຕ, ໃຫ້ໄກ່ກິນທຸກວັນຈົນກວ່າຈະເຊົາ ແລະຢາລົມແຍກໄກ່ທີ່ເປັນພະຍາດໄວ້ຕ່າງຫາກ.


12.4 ອະຫິວາ:

ອາການຂີ້ອາວເປັນນ້ຳ ເວລາໄກ່ຕາຍຕົນຕົວຈະຊັກ, ສ່ວນຫຼາຍຕົກຄອນຕາຍໃນລຶກ, ສາເຫດເກີດຈາກໄກ່ກິນຂອງເບື້ອນຈາກກ້ອງຕາລາງ ແລະ ຂີ້ສັກ, ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ພະຍາດນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບໄກ່ ຕ້ອງໃຫ້ໄກ່ກິນນ້ຳປະສົມນ້ຳສະກັດຊີວະພາບເຄືອເຂົ້າສໍ່ທຸກວັນ ແລະ ສາມເຕະປົກຂຸມນ້ຳເບື້ອນບໍ່ໃຫ້ໄກ່ລົງໄປກິນນ້ຳນັ້ນ.

ການປົວອະຫິວາ ໃຫ້ເອົາຢາ ເໝນີຊີລິນ (ໜັງລ້ານມິລິກຼາມ) ປະສົມນ້ຳກັບສັກໄດ້ 100ເຂັ້ມ, ສີດບ່ອນກ້າມຊີ້ນ. ສີດ 3ວັນຕິດຕໍ່ກັນ, ຈາກນັ້ນ 20ວັນກໍ່ສິດຢາປ້ອງກັນອະຫິວາໄກ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

12.5. ຝັດາດ

ພະຍາດນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບໄກ່ນ້ອຍ ເປັນຕົ້ນຕາມໜ້າ ແລະ ຕີນ, ພະຍາດນີ້ ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການລັກຢາປ້ອງກັນ (ຢາປ້ອງກັນຝັດາດ) ຖ້າບໍ່ມີເຂັມສັກຢາ ໃຫ້ເອົາເຂັມຈັກຫຍິບເຄື່ອງ 2 ດວງ ມັດໃສ່ ໄມ້ຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນກ່ອນໃຊ້ ຈຸ່ມນ້ຳຢາແທງ ທັງບາງໆຂອງປຶກໄກ່ແຕ່ຢາໃຫ້ຖືກເລີ້ມ ເລືອດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໜຶ່ງອາທິດຈະເກີດຕຸ່ມ ໜອງສະແດງວ່າໄດ້ຜົນ



ຖ້າໄກ່ເປັນໂລກຝັດາດຈະຕ້ອງຮັກສາຄື:

1. ເອົາເຫຼັກເຜົາໄຟຈົນແດງຈື່ຕຸ່ມນັ້ນ, ຖ້າຈີ້ໝົດທຸກຕຸ່ມໄກ່ຈະອົດບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ຈີ້ ປະມານ 1/3 (ໜຶ່ງສ່ວນສາມ) ຂອງຕຸ່ມທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທາດ້ວຍຢາ ແດງ.
2. ເອົານ້ຳໃບຫຍ້າເກັດດຽວຍ່ອງທາ.
3. ປາດຕຸ່ມແລ້ວທາດ້ວຍຫຍ້າເກັດດຽວ.
4. ປາດຕຸ່ມແລ້ວທາດ້ວຍນ້ຳປຸ່ນໃສປະສົມຂີ້ໝັນ.

ການຮັກໄກ່ເປັນພະຍາດໂດຍທົ່ວໄປ

1. ໄກ່ເປັນຫວັດເນື່ອງຈາກຄວາມອົບອຸ່ນບໍ່ພຽງພໍ, ອາກາດປຽນແປງ ຫຼື ໄກ່ ຕາກຝົນ, ລຶກໄກ່ມີລົມໜາວພັດວ່ານ, ພື້ນລຶກປຽກຈື້ນ, ອາກາດໜາວ ຂີ້ແກ້ ໄຂຄື: ປັບປຸງລຶກໄກ່ ແລະ ໃຫ້ໄກ່ກິນນ້ຳປະສົມນ້ຳສະກັດຊີວະພາບເຄືອເຂົ້າ ລໍ ຫຼື ລາຊາຍີ.
2. ໄກ່ເຈັບຫ້ອງ ໃຫ້ໄກ່ກິນບອດໃບສີດາ ຫຼື ບອດຂີ້ເຫຼັກ 2 - 3 ຍອດ ປະສົມ ມົດສົມ 2 - 3 ໂຕ.
3. ໄກ່ຂີ້ເປັນເລືອດໃຫ້ໄກ່ກິນເຂົ້າປຽກ ປະສົມກັບຖ່ານໄຮລະອຽດ.

ໝາຍເຫດ: ຫ້າມນຳສັດປ່ວຍເຂົ້າມາໄມບ່ອນລ້ຽງໄກ່.

13. ການຕະຫຼາດ.

ການຈຳໜ່າຍໄກ່ເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ຖ້າລົງຈຳໜ່າຍ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປລົງໄກ່ພື້ນເມືອງມີ 3ປະເພດໃຫຍ່ດັ່ງນີ້:

1. ລົງໄວ້ເບິ່ງຫຼິ້ນ ຫຼື ເອົາໄວ້ເປັນອາຫານພາຍໃນຄອບຄົວ
2. ລົງໄວ້ຫຼາຍແລ້ວຈຶ່ງຂາຍເທື່ອດຽວເພື່ອຈະໄດ້ເງິນເປັນກ້ອນ
3. ລົງແລ້ວແຍກອອກຂາຍເທື່ອລະຍັ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍເປັນໄກ່ຊຸ່ມ ຫຼື ໄກ່ຊອນບ່າວຊອນສາວ.

ປະເພດທີ 2ນີ້ປະຊາຊົນມັກຈະພັກໜ້າເລື່ອງຄົບລົກໄກ່ ຫຼື ເກີດໂລກລະບາດໄດ້ງ່າຍ, ຍ້ອນການເບິ່ງແຍງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ອາຫານບໍ່ພຽງພໍຈະຂາດຫິນ, ສຳລັບປະເພດທີ 3ນີ້ມັກຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງແນ່ນອນ.